

7 792690 530778



# Anusol® - HC

*Hidrocortisona acetato*

*Oxido de zinc*

*Subgalato de bismuto*

## Supositorios antihemorroidales con hidrocortisona

Industria Argentina

Venta bajo receta

### **Fórmula:**

*Cada supositorio contiene:* acetato de hidrocortisona 3,00 mg; subgalato de bismuto 64,13 mg; óxido de zinc 314,25 mg; óxido de bismuto 24,94 mg; resorcinol 24,94 mg; bálsamo del Perú 51,25 mg; benzoato de bencilo 34,25 mg; ácido bórico 142,5 mg; subioduro de bismuto 0,54 mg. Excipientes: fosfato dibásico de calcio 372,00 mg, azul ultramarino 13,74 mg; DyC amarillo N° 5 16,19 mg; manteca de cacao 180,60 mg; base para supositorios 1.605,00 mg.

### **Acción terapéutica:**

Antiinflamatorio, antipruriginoso y cicatrizante.

### **Posología y administración:**

Un supositorio al acostarse, al levantarse y después de cada evacuación, durante 3 a 6 días o hasta controlar la inflamación.

### **Acciones colaterales y secundarias:**

A las dosis aconsejadas, por lo general, no se observan efectos secundarios.

### **Advertencias, precauciones y contraindicaciones:**

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a los distintos componentes de su fórmula. Los corticoesteroides tópicos no deberán emplearse en caso de tuberculosis, micosis, infecciones virales cutáneas (incluyendo herpes, vaccinia y varicela).

Este medicamento contiene Tartrazina como colorante.

### **Antagonismo y antidotismo:**

No posee.

### **Presentaciones:**

Envases conteniendo 6 y 12 supositorios antihemorroidales.

### **Conservación:**

Conservar entre 2 °C y 25 °C. Proteger del congelamiento.

Esp. Med. aut. por el M.S. - Certificado N° 1.  
Elaborado por Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co., USA.  
Sanabria 2353 - Buenos Aires.  
Director Técnico: Isaac J. Nisenbaum - Farmacéutico.

Última revisión: Septiembre / 1981  
53077-00  
1-dil-g

Bajo Licencia W.L.

